

Памятка экстренной профилактики ВИЧ-инфекции

Для экстренной профилактики ВИЧ-инфекции должна быть укомплектована аптечка:

- 70% спирт- 100 мл (для обработки кожных покровов, полости горла и рта)
- 5% р - р йода (для обработки раневой поверхности)
- ватные и марлевые тампоны (ватные палочки) - по 5 штук
- напальчники - 5 штук,
- бинт марлевый медицинский стерильный (5мм. х 10 см.) -2 шт.
- лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см х7,2 см.)- 3 шт.
- салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см. х 14см, № 10_ - 1 упак.
- ножницы

При попадании потенциально опасного биологического материала на любые участки тела необходимо немедленно прекратить проводимые манипуляции и приступить к проведению профилактических мероприятий

Аварийная ситуация	Действия медицинского персонала
При проколе (порезе)	<ol style="list-style-type: none"> 1. немедленно снять перчатки 2. вымыть руки с мылом под проточной водой 3. обработать 70% спиртом 4. смазать ранку 5% спиртовым р-ром йода 5. лейкопластырь
При попадании крови или других биологических жидкостей на кожные покровы	<ol style="list-style-type: none"> 1. обработать 70% спиртом 2. обмыть водой с мылом 3. повторно 70% спиртом
При попадании биологической жидкости на слизистую глаз, носа, рта	<p><u>Рот и горло</u> прополаскивают большим количеством воды, затем 70% раствором этилового спирта</p> <p>Слизистую оболочку <u>носа и глаза</u> обильно промывают водой</p> <p><i>НЕ ТЕРЕТЬ!</i></p>
При попадании крови или других биологических жидкостей на рабочую одежду	Снять и погрузить в дезинфицирующий р-р
При попадании биологической жидкости на пол (бой пробирки)	<p>Место накрыть ветошью, обильно смоченной в дез. р-ре (экспозиция 1 час) все собрать и вместе с ветошью поместить в емкость для обработки ветоши.</p> <p>Повторно накрыть место аварии ветошью с дез. р-м (экспозиция 1час)</p> <p>Произвести уборку кабинета по типу генеральной.</p> <p>Использовать средства СИЗ</p>

Действия пострадавшего медработника:

1. Провести экстренную профилактику ВИЧ-инфекции (согласно таблицы)
2. Взять кровь у пациента и у себя
3. Провести экспресс-тест на ВИЧ
4. Сообщить руководителю
5. Заполнить журнал аварийной ситуации, записать данные об экспресс-теста на ВИЧ-инфекцию
6. Заполнить направления на анализы крови в центр «СПИД» (на направлении указывать: «потенциальный источник», «аварийная ситуация»- для медработников), анализы на гепатиты и ЭДС.

Действия руководителя

1. Уточнить возникновение аварийной ситуации
2. Сообщить эпидемиологу и/или генеральному директору

Действия эпидемиолога

1. Оформить протокол аварийной ситуации карта заражения риска
2. После консультации со специалистами Центра СПИД, назначить прием антиретровирусных препаратов(лопинавир/ритонавир+зидовудин/ламивудин) в целях постконтактной профилактики заражения ВИЧ (в течение первых двух часов после аварии, но не позднее 72 часов)
3. Контролировать сдачу анализов на ВИЧ, гепатиты в течение года (3,6,12 месяц)

Памятка разработана на основании: СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» от 11.01.2011г.
Методические рекомендации МЗ и соц. развития РФ №5961-РХ от 06.08.07г., Приказа МЗ РФ от 9 января 2018 г
№ 1 Н