

**ВИЧ не меняет человека, не делает его опасным.**

**ВИЧ не передаётся, когда вы**

**пользуетесь  
общей посудой**



**плываете  
в бассейне**



**принимаете душ  
общим туалетом**




**разговариваете  
друг с другом**



**целуете**



**пожимаете руки**



**В мире не зарегистрировано ни одного случая  
передачи ВИЧ-инфекции бытовым путем.**


**Толерантность**



[www.livehiv.ru](http://www.livehiv.ru)

# ВИЧ-инфекция и СПИД: симптомы и лечение

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) – вирус, вызывающий СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита)



► ВИЧ попадает в организм человека

► ослабляет иммунную систему

► поражает клетки, борющиеся с инфекциями  
защищающиеся от инфекций

► развивается одно или несколько  
серьезных заболеваний

► организм не способен

## Диагностика

Обнаружение антител к вирусу с помощью  
иммуноферментного анализа - тестирование,  
которое можно пройти бесплатно в СПИД-центрах

## Как происходит заражение

- о незащищенный (без презерватива)  
проникающий половой акт
- о совместное использование шприцев, игл и другого  
инъекционного оборудования
- о использование нестерильного инструментария для  
татуировок и пирсинга
- о использование чужих бритвенных принадлежностей,  
зубных щеток с остатками крови
- о передача от ВИЧ-положительной матери ребенку
- о лечебно-диагностические манипуляции (операции,  
переливание крови и т.п.)

## Лечение

Лекарства от СПИДа пока нет.

Существуют препараты, позволяющие  
прожить долгую и здоровую жизнь  
ВИЧ-положительным людям.

## Симптомы

- о лихорадка более 1 месяца
- о диарея более 1 месяца
- о необъяснимая потеря массы тела на 10% и более
- о затяжные пневмонии
- о постоянный кашель
- о затяжные, рецидивирующие вирусные, бактериальные, паразитарные болезни
- о сепсис
- о увеличение лимфоузлов больше 1 месяца
- о подострый энцефалит



! Вирус может существовать в организме  
человека в течение 10-12 лет  
бессимптомно

## Последняя стадия - СПИД:


- о онко-СПИД (sarcoma Капоши и лимфома головного мозга)
- о нейро-СПИД (разнообразные поражения ЦНС и периферических нервов)
- о инфекто-СПИД (многочисленные инфекции)



После попадания вируса в кровь организму человека требуется от 25 дней до трех месяцев для выработки достаточного количества антител, которые можно обнаружить при анализе крови. Этот период называется «период окна», в течение которого тестирование может показать отрицательный результат.

# ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

- Головная боль
- Повышенная температура
- Язвы в полости рта
- Молочница в полости рта
- Боли в горле
- Кожная сыпь
- Боли в суставах
- Припухание лимфоузлов
- Расстройство желудка
- Понс



RODINKA.NET

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВАКЦИНА ИЛИ ПРИВИВКА, КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЛИ БЫ ОТ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, НЕ СОЗДАНЫ. ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ, ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА:



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕЗЕРВАТИВ ПРИ КАЖДОМ ПОЛОВОМ КОНТАКТЕ



ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ ПОЛОВЫХ КОНТАКТОВ (БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВА)



НИКОГДА НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАРКОТИКИ

ВСЕ  
ВОЗРАСТНЫЕ  
ГРУППЫ  
ПОДВЕРЖЕНЫ  
ЗАРАЖЕНИЮ

170  
СЛУЧАЕВ  
ЗАРАЖЕНИЯ  
ЕЖЕДНЕВНО

БОЛЕЕ  
**40%**

СЛУЧАЕВ  
ЗАРАЖЕНИЯ  
ПРОИСХОДИТ  
ПОЛОВЫМ  
ПУТЕМ

ВИЧ В РОССИИ

# СЕГОДНЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ —

ЭТО ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, Т. К. ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НЕ ДАЕТ ВИРУСУ РАЗВИВАТЬСЯ



**ВАЖНО ОТМЕТИТЬ!** БРАК И ПОСТОЯННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЗАЩИЩАЮТ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ ТОЛЬКО ЕСЛИ ОБА ПАРТНЕРА ПРОШЛИ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ И ХРАНЯТ ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ.



ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ХОТЯ БЫ РАЗ В ЖИЗНИ ВСТУПАЛ В ПОЛОВОЙ КОНТАКТ БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВА ИЛИ ИМЕЛ ОПЫТ УПОТРЕБЛЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ.

ОПРЕДЕЛИТЬ НАЛИЧИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ НЕВОЗМОЖНО. ТЕСТ НА ВИЧ — ЕДИНСТВЕННЫЙ ДОСТОВЕРНЫЙ СПОСОБ УЗНАТЬ, ЕСТЬ ВИРУС В КРОВИ ИЛИ НЕТ.



БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ

AHF

AIDS HEALTHCARE FOUNDATION



**ЗАЧЕМ СДАВАТЬ ТЕСТ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ?**

НЕЗНАНИЕ ВИЧ-СТАТУСА ПАРТНЕРА УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ



ТЕСТ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СДАТЬ ТЕМ ПАРАМ, КОТОРЫЕ РЕШИЛИ НАЧАТЬ ИНТИМНУЮ ЖИЗНЬ, ИЛИ — РЕШИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРЕЗЕРВАТИВА.



ТЕСТ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СДАТЬ ПРИ ПЛАНРИРОВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ. ТОЛЬКО ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ЗАЩИТИТЬ БУДУЩЕГО РЕБЕНКА ОТ ЗАРАЖЕНИЯ.



ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЗАРАЖЕН ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, ОЧЕНЬ ВАЖНО НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННО. ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РОССИИ БЕСПЛАТНО.